

## DEMONSTRAÇÃO DA IRRACIONALIDADE DE ALGUNS NÚMEROS USANDO DOBRADURAS

<sup>1</sup> Caio A. G. De M. Andrade, <sup>2</sup> Ismael S. Silva, <sup>3</sup> Daniel C. de M. Filho

<sup>1</sup> UFCG/CCT/UAMAT/ Bolsista PET-Matemática UFCG – e-mail: caioagma@gmail.com

<sup>2</sup> UFCG/CCT/UAMAT/ Bolsista PET-Matemática UFCG – e-mail: ismael.negro1@hotmail.com

<sup>3</sup> UFCG/CCT/UAMAT/Professor UAMAT, Tutor PET-Matemática UFCG – e-mail: daniel@mat.ufcg.edu.br

### Introdução


Na tentativa de investigar propostas para abordagem de tópicos de Matemática para o ensino fundamental e médio, optamos por trabalhar um conceito que é marcado por histórico de difícil compreensão por parte dos discentes: o conceito de número irracional. Nesse trabalho, procuramos uma dessas demonstrações que fosse simultaneamente generalista e didática, culminando no método da **dobradura**, tema do presente trabalho.

### Objetivo

Dentre os resultados clássicos envolvendo números irracionais, pretendemos demonstrar a irracionalidade dos números da forma  $\sqrt{n^2 + 1}$  para todo  $n$  natural e  $\sqrt{n^2 - 1}$ , para todo  $n$  natural e diferente de 1. Sob um viés geométrico, procuramos verificar se a proposta do referido método oferece demonstrações paupáveis e compreensíveis para estudantes do ensino fundamental e médio sem, contudo, perder de vista o rigor matemático.


### Metodologia

A pesquisa que fizemos é de caráter bibliográfico, se baseando, principalmente, em [CWIKEL][1], donde extraímos o método do “paper folding”, que denominamos **dobradura**. Esse método baseia-se numa construção que pode ser feita com dobras de papel em formas de triângulos convenientes à demonstração desejada.




Consideremos o triângulo retângulo ABC mostrado na figura acima. Ao efetuarmos uma dobra sobrepondo o lado BC ao lado AB, obtemos o triângulo AB'C', triângulo semelhante a ABC e com lados de medidas estritamente menores.

Uma outra observação é que, caso o triângulo ABC tenha lados inteiros, e  $c = nb$  ou  $a = nb$  para algum  $n$  inteiro, então o triângulo AB'C' também terá lados inteiros, e valerá  $c' = nb'$  ou  $a' = nb$ , fato que decorre das equações dos lados do triângulo AB'C' mostradas abaixo.




### Resultados

Se supusermos  $\sqrt{n^2 + 1}$  racional, isto é,  $\sqrt{n^2 + 1} = c/b$ , com  $c$  e  $b$  naturais, geometricamente, teríamos um triângulo retângulo de lados  $c$ ,  $b$  e  $nb$ , conforme a figura que segue.



Uma vez que o triângulo ABC é retângulo e tem lados inteiros podemos aplicar o método da dobradura e, com isso, obter um triângulo semelhante ao triângulo ABC, de lados também inteiros e estritamente menores que os de ABC. Aplicando o processo indefinidamente (vide figura acima), chegaríamos a um absurdo, porquanto uma sequência decrescente de números inteiros positivos é impossível. Concluímos então que  $\sqrt{n^2 + 1}$  é irracional.

Para o caso de supormos  $\sqrt{n^2 - 1} = a/b$ , com  $a$  e  $b$  naturais, desde que  $n \neq 1$ , poderíamos formar o triângulo abaixo, incorrendo num absurdo análogo ao caso anterior.



### Conclusão

Por envolver uma abordagem geométrica e trabalhar com dobraduras, concordamos que o método apresentado, de fato, mostra-se como uma forma mais assimilável para estudantes com menos experiência, não só da irracionalidade dos números aqui trabalhados, mas de demonstrações matemáticas de forma geral.

### Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer aos colegas do grupo PET-Matemática UFCG e, em especial, ao nosso tutor pela motivação e orientação prestada. Queremos agradecer também ao FNDE e ao próprio PET-Matemática UFCG por financiarem esse trabalho.

### Referências

- [1] CWIKEL, M.. “Origami” proofs of irrationality of square roots. Technion, Israel Institute of Technology, Haifa 32000, Israel. Disponível em <http://www.math.technion.ac.il/~mcwikel/paperfold.pdf> Acesso em 3 de setembro de 2015.
- [2] BARBOSA, J. L. M.. *Geometria Euclidiana Plana*. Editora SBM – Coleção do Professor de Matemática.
- [3] SINGH, S. *O Último Teorema de Fermat: a história do enigma que confundiu as maiores mentes do mundo durante 358 anos*; Tradução de Jorge Luiz Calife. – 2ª ed. – Rio de Janeiro: Record, 1998.
- [4] PARÂMETROS Curriculares Nacionais: matemática / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/ SEF, 1998. 146 p.